



Министерство здравоохранения и
социального развития Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074
Телефон: (495) 698 45 38; 698 46 11

Субъектам обращения
лекарственных средств

06.10.2011 № 04U-937/11
N RC/QC/BCC-2011-00068 12.07.2011

На № _____ от _____

Об изменении дизайна упаковок

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития сообщает об изменении градиентной цветовой заливки в макетах вторичной упаковки лекарственного препарата «Терафлекс Адванс, капсулы» производства компании «Сагмел, Инк.», США.

Лекарственный препарат «Терафлекс Адванс, капсулы № 60» в упаковках с измененным дизайном выпускается, начиная с серии 104308; «Терафлекс Адванс, капсулы № 120» - начиная с серии 111154.

Приложение: макеты вторичной упаковки с измененным дизайном на 3 л в
1 экз.

Врио руководителя

Е.А.Тельнова

| | | | |
|--------|---------|--------|--------|
| Colors | 282 C | 279 C | 1815 C |
| | Black C | 1805 C | |

ТЕРАФЛЕКС АДВАНС

THERAFLEX ADVANCE

При остеоартрозе крупных суставов, остеохондрозе позвоночника, сопровождающихся умеренным болевым синдромом

Хондроитина сульфат участвует в построении и восстановлении хрящевой ткани, защищает ее от разрушения и улучшает подвижность суставов.

Глюкозамина сульфат активирует синтез протеогликанов, гиалуроновой, хондроитинсерной кислот и других веществ, входящих в состав суставных оболочек, внутрисуставной жидкости и хрящевой ткани.

Ибупрофен оказывает анальгетическое, жаропонижающее и противовоспалительное действие.

ТЕРАФЛЕКС АДВАНС

THERAFLEX ADVANCE



СОСТАВ:
 ибупрофен 100 мг
 глюкозамина сульфат 250 мг
 хондроитина сульфат натрия 200 мг

30 капсул



ТЕРАФЛЕКС АДВАНС
 THERAFLEX ADVANCE

При остеоартрозе крупных суставов, остеохондрозе позвоночника, сопровождающихся умеренным болевым синдромом

Health Life

СЕРИЯ:
 ДАТА ИСП. ГОТОВИ ДО:

Произведено Sartel, Инк., Чикаго, США
 Сделано в США

Состав. (1 капсула содержит) действующие вещества:
 глюкозамина сульфат 250 мг, хондроитина сульфат натрия 200 мг, ибупрофен 100 мг.
 Все компоненты являются высококачественными веществами, полученными из натуральных источников. Глюкозамин сульфат и хондроитин сульфат являются естественными компонентами суставной жидкости и хрящевой ткани. Ибупрофен является противовоспалительным средством, которое снимает боль и уменьшает воспаление. Глюкозамин сульфат и хондроитин сульфат являются естественными компонентами суставной жидкости и хрящевой ткани. Ибупрофен является противовоспалительным средством, которое снимает боль и уменьшает воспаление. Глюкозамин сульфат и хондроитин сульфат являются естественными компонентами суставной жидкости и хрящевой ткани. Ибупрофен является противовоспалительным средством, которое снимает боль и уменьшает воспаление.

ТЕРАФЛЕКС АДВАНС
 THERAFLEX ADVANCE

При остеоартрозе крупных суставов, сопровождающихся умеренным болевым синдромом

| | | | |
|--------|---------|--------|--------|
| Colors | 282 C | 279 C | 1815 C |
| | Black C | 1805 C | |

ТЕРАФЛЕКС АДВАНС

THERAFLEX ADVANCE

При остеоартрозе крупных суставов, остеохондрозе позвоночника, сопровождающихся умеренным болевым синдромом

Хондроитин сульфат участвует в построении и восстановлении хрящевой ткани, защищает ее от разрушения и улучшает подвижность суставов

Глюкозамина сульфат активизирует синтез протеогликанов, гиалуроновой, хондроитинсерной кислот и других веществ, входящих в состав суставных оболочек, внутрисуставной жидкости и хрящевой ткани

Ибупрофен оказывает анальгетическое, жаропонижающее и противовоспалительное действия

ТЕРАФЛЕКС АДВАНС

THERAFLEX ADVANCE

При остеоартрозе крупных суставов, остеохондрозе позвоночника, сопровождающихся умеренным болевым синдромом

СЕРИЯ:
ДАТА ИЗГЛ. ГОДЕН ДО:

Health Life

ТЕРАФЛЕКС АДВАНС

THERAFLEX ADVANCE



СОСТАВ:
ибупрофен 100 мг
глюкозамина сульфат 250 мг
хондроитина сульфат натрия 200 мг

120 капсул



Произведено Orlan, Минск, Чехия, США
Сделано в США

Состав: (1 капсула содержит) Действующие вещества: глюкозамина сульфат 250 мг, хондроитина сульфат натрия 200 мг, ибупрофен 100 мг, вспомогательные вещества: микрокристаллическая целлюлоза, кукурузный крахмал, прокарированный крахмал, стеариновая кислота, карбоксиметилцеллюлоза, желатиновая капсула: желатин, титана диоксид, FD&C голубой № 1 лак, мастицик.

Фармакологические свойства. Терафлекс Адванс представляет собой комбинацию противовоспалительного, жаропонижающего и обезболивающего действия за счет нестероидного противовоспалительного препарата ибупрофена и хрящевой ткани. Ибупрофен является производным пропионовой кислоты и оказывает противовоспалительное и обезболивающее действие. Глюкозамина сульфат и хондроитин сульфат участвуют в построении и восстановлении хрящевой ткани. Хондроитин сульфат участвует в построении и восстановлении хрящевой ткани. Глюкозамина сульфат участвует в построении и восстановлении хрящевой ткани. Ибупрофен оказывает анальгетическое, жаропонижающее и противовоспалительное действия.

Показания к применению. Остеоартроз крупных суставов, остеохондроз позвоночника, сопровождающийся умеренным болевым синдромом.

Способ применения и дозы. Взрослым принимать по 2 капсулы 3 раза в сутки после еды. Капсулы принимать внутрь, запивая небольшим количеством воды. Длительность приема без консультации врача не должна превышать 5-х недель. Длительное использование препарата следует сопровождать с ерек.

Условия хранения. В сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте. Срок годности - 2 года. Не применять по истечению срока годности.

Основная упаковка. Без рецепта.

№ 010/010/11/11/11

ТЕРАФЛЕКС АДВАНС

При остеоартрозе крупных суставов, остеохондрозе позвоночника, сопровождающихся умеренным болевым синдромом

| | | | |
|--------|---------|--------|--------|
| Colors | 282 C | 279 C | 1815 C |
| | Black C | 1805 C | |

ТЕРАФЛЕКС АДВАНС

THERAFLEX ADVANCE

При остеоартрозе крупных суставов, остеохондрозе позвоночника, сопровождающихся умеренным болевым синдромом

Хондроитина сульфат участвует в построении и восстановлении хрящевой ткани, защищает ее от разрушения и улучшает подвижность суставов.

Глюкозамина сульфат активизирует синтез протеогликанов, гиалуроновой, хондроитинсерной кислоты и других веществ, входящих в состав суставных оболочек, внутрисуставной жидкости и хрящевой ткани.

Ибупрофен оказывает анальгетическое, жаропонижающее и противовоспалительное действие.

NDC 67641-64-72

ТЕРАФЛЕКС АДВАНС

THERAFLEX ADVANCE



СОСТАВ:
ибупрофен 100 мг
глюкозамина сульфат 250 мг
хондроитина сульфат натрия 200 мг

60 капсул

ТЕРАФЛЕКС АДВАНС

THERAFLEX ADVANCE

При остеоартрозе крупных суставов, остеохондрозе позвоночника, сопровождающихся умеренным болевым синдромом

СЕРИЯ:
ДАТА ИЖ/ГОДЕНД

Health Life



Сделано в США Произведено Carlen, Инк., Чикаго, США

Состав. (1 капсула содержит) Действующие вещества: глюкозамина сульфат 250 мг, хондроитина сульфат натрия 200 мг, ибупрофен 100 мг. вспомогательные вещества: микрокристаллическая целлюлоза, кукурузный крахмал, прежелатинизированный крахмал, стеариновая кислота, карбоксимелтилкрахмал, магний стеарат, кросполон, кремниевая кислота, повидон. Фармакологическая форма: капсулы. "PDC Global № 1" лак. желатиновая капсула, титана диоксид, "PDC Global № 1" лак. Хондроитина сульфат участвует в построении и восстановлении хрящевой ткани, защищает ее от разрушения и улучшает подвижность суставов. Глюкозамина сульфат активизирует синтез протеогликанов, гиалуроновой, хондроитинсерной кислоты и других веществ, входящих в состав суставных оболочек, внутрисуставной жидкости и хрящевой ткани. Ибупрофен является нестероидным противовоспалительным средством и оказывает анальгетическое, жаропонижающее и противовоспалительное действие. Показания к применению. Остеоартроз крупных суставов, остеохондроз позвоночника, сопровождающийся умеренным болевым синдромом. Способ применения и дозы. Взрослым принимать по 2 капсулы 3 раза в сутки после еды, капсулы принимать внутрь, запивая небольшим количеством воды. Длительность приема без консультации врача не должна превышать 3-х недель. Дальнейшее использование препарата следует согласовывать с врачом. Условия хранения. В сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте, при температуре не выше 25 °C. Срок годности - 2 года. Не применять по истечении срока годности. Условия отпуска. Без рецепта.

При остеоартрозе крупных суставов, остеохондрозе позвоночника, сопровождающихся умеренным болевым синдромом

